


**Bijgaand stuk wil een algemeen aspect belichten omtrent de gevolgen die vaccinaties kunnen geven.**

### **Schema effect vaccinaties op weerstand en aanleg**



Boven heb ik in beeld gebracht:

**-de erfelijke aanleg**, die bij iedereen anders is. Bij de een is de aanleg voor allergie en eczeem sterker aanwezig, bij de ander een aanleg tot diabetes of gedragsstoornissen, etc. Een baby wordt geboren met die aanlegfactoren. Uit de familie-anamnese komen deze naar voren.

**-de individuele geaardheid van zijn levensenergie (ook genoemd levenskracht of weerstand)**, die hij meekrijgt van de ouders en voor een deel zelf meebrengt. Deze is nodig voor groei en ontwikkeling en genezing bij ziekte, voor de kracht om te verteren, niet alleen voeding maar ook indrukken. De levenskracht of weerstand geeft de energie om af te rekenen met ziektekiemen, die lichaams-vreemd zijn. Een resultaat van de strijd met allerlei virussen, bacteriën, zien we in de opbouw van het antistoffen-spectrum in het bloed.

De levenskracht zorgt er ook voor dat lichaamseiwit dat in de alledaagse stofwisseling steeds afgebroken wordt op een gezonde eigen manier vernieuwd wordt. Door het afbreken van het lichaam ontstaat de mogelijkheid om erfelijk materiaal om te vormen tot eigen substantie. Al doende kan het kind met zijn kracht dan ook erfelijke aanleg langzaam harmoniseren, zodat hij niet zonder meer aan de aanleg hoeft te gaan lijden.

De levenskracht heeft de baby hard nodig voor ontwikkeling van zijn vermogens.

Als er energie gebruikt moet worden voor andere dingen, zoals het verwerken van stressfactoren, dan kan het niveau van de weerstand verlaagd raken en bij te heftige stress of teveel stressfactoren bij elkaar kan er een zo laag niveau optreden dat de levensenergie de aanleg niet meer kan beheersen. Dan treedt de aanleg/zwakte naar voren en krijgt het kind symptomen. Die symptomen had het kind niet sowieso behoeven te ontwikkelen als de weerstand goed was gebleven. Sterker nog; dankzij een hoog weerstandsniveau heeft het kind de kans om juist die erfelijke aanleg geleidelijk zo om te vormen dat het Ik de Heerser wordt over die aanleg en niet de Slaaf hoeft te worden en aan die aanleg gaat lijden, dus ziek wordt. Het lichamelijke instrument op aarde zal des te beter gebruikt kunnen worden naarmate het

beter lukt om de erfelijke aanleg tot ziekte om te bouwen. En het lichaam als instrument zal passender zijn voor de taak die het Ik zich heeft gesteld in deze incarnatie.

### **Er zijn vele stressfactoren die in het eerste levensjaar een rol kunnen spelen.**

- **Shocks:** bij het kind zelf of bij de moeder, door bijv. een trauma tijdens de zwangerschap of de bevalling, ervaringen met couveuse, ziekenhuisopname, val van de commode, veel paniek in de omgeving rond het kind.
- **psychisch niet aanwezige vader of moeder:** bijvoorbeeld bij depressie of groot verdriet, kortom geestelijke belasting door andere gebeurtenissen
- **extreme temperaturen of temperatuur wisselingen:** deze vragen veel van het aanpassingsvermogen van het lichaam. Ook door inadequate kleding: te dun, synthetisch materiaal, te weinig laagjes, gaat veel energie verloren die beter benut kan worden voor opbouw en weerstand.
- **te veel indrukken** om het kind heen. Hierbij speelt het karakter van het kind een grote rol: wat voor de een veel is kan de ander wel goed aan. Maar over het algemeen krijgen baby's te weinig rust en regelmaat en te veel of te heftige indrukken te verwerken.
- **voeding:** wat kan dit kind goed verteren, waar kan het slecht tegen (denk aan allergieën, intoleranties, suikergebruik). Borstvoeding is altijd beter dan flesvoeding: o.a. stimuleert het afweersysteem en levert de goede vetten voor het zenuwstelsel. Tijdens borstvoeding komt de baby in een diepe ontspanning (alfa-hersengolven). Ontspanning werkt positief op het immuunsysteem. (Psycho-neuro-immunologie)
- een **negatieve sfeer** rond het kind: slechte relatie ouders, ongewenst kind
- **chronische stress** bij ouders.
- **tanden krijgen** vraagt veel energie zodat het kind stressgevoeliger wordt. Vele kinderen krijgen last van oren, verkoudheden, nachtelijke onrust, diarree in die periode, ongeacht of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Ook hier wordt het soort van klachten weer voor een groot deel bepaald door de individuele aanleg.
- **infecties**, ook lichte, vragen energie voor genezing. De weerstand om andere factoren te verteren is verminderd. Dit treedt des te sterker op bij een verkeerde begeleiding (koortsremming! En door onnodige onderdrukking van symptomen).
- **onregelmatig leven:** o.a. een chaotische dagindeling, teveel gesleep met het kind.

**De genoemde factoren geven al zoveel stress dat een vaccinatie daarbovenop vaker schade kan veroorzaken.** De ervaring leert dat de vaccinaties een heftige stressfactor zijn voor de algehele weerstand en het effect daarvan op de weerstand kan, in meer gevallen dan algemeen aangenomen wordt, blijvend zijn.

Bovendien zijn de kwalen/ziekten die daardoor naar buiten komen moeilijk te behandelen. Het lijkt net of er een 'doos van pandora' is opengegaan.

Daarom behandelen we eerst de op dat moment aanwezige negatieve factoren of een eenzijdige aanleg of een reedsbestaande zwakke weerstand.

Wanneer vaccinaties uitgesteld worden krijgt het kind de kans sterker te worden en zijn immuun systeem te laten uitrijpen.

Als je na 1 jaar start met vaccineren, kennen ouders het kind goed en wordt het aan de ouders direct duidelijk wanneer er een verstoring optreedt, die vóór de vaccinatie niet bestond.

Bijv. ineens oorontstekingen, die weliswaar in de aanleg van de familie zaten, maar nog niet te voorschijn gekomen waren.

Als de erfelijke zwakte naar voren komt ten gevolge van een verlaging van de algemene weerstand door een verstoord evenwicht, kan deze gedachte een verklaring zijn voor het grote scala van schadelijke bijwerkingen, die kunnen ontstaan in aansluiting op vaccinaties. Dit wordt samengevat in de term± PostVaccinaalSyndroom. Zie [www.tinusmits.nl](http://www.tinusmits.nl)

Bij vaccineren na 1 jaar zijn de kinderen in het eerste levensjaar veel gezonder, blijkt uit ervaringen van velen en wordt gestaafd door onderzoek. Het hebben van gemiddeld 6x verkoudheid of oorontstekingen of bronchitis in het eerste levensjaar hoeft mijns inziens dus niet normaal gevonden te worden.

Voor de reacties in de tijd (weken) aansluitend op een vaccinatie is onderbouwing te vinden in het bestuderen van het **Non Specific Stress Syndroom**, beschreven door Seleye in 1936 en uitgewerkt in vele volgende jaren van onderzoek en publicaties, en bevestigd door onderzoek met de baby-cot-watch door Drs. Viera Scheibner, in haar boek 'Vaccinaties' beschreven:

Dit Stress-syndroom heeft een bepaald tijdsverloop voor vaccinaties:

- Een sterke reactie op dag 1 en 2, door de acute stress, en een lichte na-reactie op dag 5 en 6.
- Op de 15<sup>de</sup> en 16<sup>de</sup> dag na de vaccinatie treedt er een sterke daling in de weerstand op (een soort uitputtingsreactie) en tengevolge daarvan kunnen allerlei infecties of kwalen optreden of verergeren, die

- 1-of na enkele weken kunnen genezen,
- 2-of in een chronische situatie overgaan,
- 3-of kunnen verslechteren.

LET DUS GOED OP HET VERLOOP van reacties die optreden juist twee weken na de prik:  
1-Als het kind na enkele weken genezen/hersteld is van de klacht, laat dan pas als het minstens twee weken gezond is, de volgende prik geven. De tussenruimte tussen de vaccinaties wordt dan langer. Dat is geen enkel bezwaar, integendeel beter voor de opbouw van immuniteit.

2-Als het kind een chronische verstoring van zijn welbevinden laat zien in aansluiting op vaccinatie, laat dan eerst behandelen. De behandeling kan alleen maar op een additieve geneeskundige manier, aangezien de reguliere medische wetenschap veelal niet gelooft in chronische ziekte vanwege vaccinaties en ook geen behandeling daarvan kent.

3-Als er een heftige reactie optreedt met name rond de 15<sup>e</sup> dag na de vaccinatie en als de toestand daarna ook nog verslechtert, dan is het aan te bevelen acuut een behandeling in te zetten in overleg met arts/therapeut. Je kunt o.a. de homeopathische verdunning van het vaccin in 30Kpotentie of een C 30, geven om een afzwakking te krijgen van de heftige reactie op het vaccin. ( 1 korrel in een beker lauw water oplossen en daar een theelepeltje geven elk uur tot je merkt dat de heftigheid vermindert). Doe dit in samenwerking met de homeopaath. Of vraag de antroposofisch arts om ondersteuning met antroposofische middelen. En pleeg overleg met de behandelaar over het vervolgen van het vaccinatieprogramma.

**Handig is een vaccinatiedagboekje, dat adequaat en tijdig ingevuld moet worden. Alles wat opvalt en anders verloopt dan ervóór moet genoteerd worden, gedurende tenminste 4 weken na de prik.**

De onderbouwing van het bovenstaand verhaal wordt gevonden o.a. in de zienswijze en grondslagen van de homeopathische geneeskunst, in de antroposofische mensvisie en haar geneeskundige inzichten en in de basis van de natuurgeneeswijze e.a.

Daarnaast bevestigen de dagelijkse ervaringen van vele therapeuten en ouders het bovenbenoemde beeld.

Het Non-Specific-Stress-Syndroom met zijn symptomen wordt beschreven door Selye (1936) en Viera Scheibner refereert daaraan.

De resultaten van Drs. Tinus Smits met de zogenoemde 'ontstoringstherapie bij vaccinatie-schade' bevestigen de nadelige bijwerkingen en schade, die de vaccinaties kunnen hebben. Ook Dr. Isaac Golden heeft ongeveer op dezelfde tijd aan de andere kant van de aardbol hetzelfde ontwikkeld. Zie [www.homstudy.net](http://www.homstudy.net)

De gevolgen die hij beschrijft lijken sterk op de beschrijvingen van het Non Specific Stress Syndroom. Zie de brochure: PostVaccinaalSyndroom [www.tinusmits.nl](http://www.tinusmits.nl)  
Spectaculaire resultaten motiveren tot nadenken en navolgen.

### **Als je de weerstand ondersteunt**

voordat je gaat vaccineren, vergroot je de kans op een ongestoord verloop.

De diverse additieve geneeskundige richtingen kennen diverse middelen.

\*In elk geval is het goed een reserve hoeveelheid vit C in het lichaam aan te leggen, aangezien bij stress veel vit C verbruikt wordt. Dus Vitamine C extra, 3 dg voor tot 3 wk na de vaccinatie.

\*De Orthomoleculaire geneeskunde of fythotherapie kennen ondersteunende middelen

\*Alleen een 100% gezond kind vaccineren

\*Afwegen wat het belangrijkste is voor dit kind op elk moment

\*Kijk naar het individuele kind, kies een individueel

prikprogramma, en houdt rekening met aanwezigheid van andere stressfactoren

\*Belladonna/Skorodiet (Weleda)= vaccinatiekorrels, ondersteunt de harmonie van de wezensdelensamenwerking. 1 week voor tot twee weken na vaccinatie.

\*Nosodes van het te geven vaccin vooraf en erna. Dit is de homeopathische verdunning van het vaccin dat gegeven gaat worden. Werkt preventief en therapeutisch.

\*Belladonna comp.supp. (Wala) of Viburcol (Heel) of Kinditherm (VSM) bij koorts

\*Met vaccineren starten na 1 jaar

\* Een bewuste door ouders gedragen keuze werkt positief (Psycho-neuro-immunologie)

\* Bioresonantie, preventie en therapie

Ondevit, preventie en therapie, e.a. zoals Mesologie.....

Geneesmiddelen in samenspraak met de arts/ therapeut toepassen

**Noor Prent 2013**

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

[www.vaccinatieschade.be](http://www.vaccinatieschade.be)

[www.nvic.com](http://www.nvic.com)

[www.whale.to/vaccines](http://www.whale.to/vaccines)

[www.vaccinedamageprevention.be](http://www.vaccinedamageprevention.be)

[www.efvv.org](http://www.efvv.org)

[www.vaccinvrij.nl](http://www.vaccinvrij.nl)

[www.vacfacts.info](http://www.vacfacts.info)

